

**-ПОМОЩНИК** оператора. До  
20т.р. Тел. 8-937-482-15-31  
**-КОНТРОЛЕР** пропусков. До 23т.  
Тел. 8-9-9-601-74-08  
**-СОСТАВИТЕЛЬ** отчетов. До 19т.  
Тел. 8-917-460-43-54

**-ПРОДАВЕЦ** щенков  
8-917-804-10-73

полицейскую инспекцию можно получить в ходе по работе с личными данными Управления МВД по Республике Башкортостану Стерлитамаку, пр. Ленина, 8 (3473) 20-45-74

для участия в соревнованиях по Приморскому Федера-  
ному округу.

и мужчин (18 лет и старше)  
то – клуб «Батыр»  
лигамак)  
то – клуб «Витязь»  
лигамак)  
то – клуб «Алгудар»

# ► ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

# О ПРОБЛЕМЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, вызывающий заболевание – ВИЧ-инфекцию, появление которой известна как синдром приобретённого иммунодефицита (СПИД). Данное заболевание относится социально-обусловленным бессимптомным. ВИЧ-инфекция затрагивает иммунную систему человека. При обострении иммунитета организма становится уязвимым для многих инфекций и заболеваний. Некоторые из них могут представлять опасность

**ДЛЯ ЖИЗНИ.**  
Особую опасность вызывает недостаточная информированность молодежи о проблеме ВИЧ-инфекции.

**ВИЧ**, поражая защитную систему человека, постепенно ослабляет иммунитет. Человек живущий с ВИЧ, может выглядеть и чувствовать себя хорошо на протяжении от многих ме-

Цев до несколько лет и даже знать, что он инфицирован. Агноз СИМД обычно ставится спустя несколько лет после развития ВИЧ, когда у человека развиваются одно или несколько серьезных заболеваний. Пример, ранние признаки гиперсирования ВИЧ-инфекции включают такие заболевания как кандидоз (малочиницу) у стират и ЖКТ, продолжительное повышение температуры.

ночную потливость, понос, по-  
терю веса, частые острые респи-  
раторные инфекции, опоясыва-  
ющий лишай (герпес) и др.

Итого было прописано 10 курсов, тоже присутствует, но в таком матом количестве, что опасности заражения нет.

ВИЧ-инфекцией нельзя заразиться при прокосновении, рукопожатии, массаже, при совместном использовании одног постельного белья, питья и одного стакана. Также нельзя разиться через сиденье унитаза, разиться через чихание или кашель, чихания или при укусе комара.

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-

так же называемые биологическими жидкостями), поэтому заряд при попадании в организмы здорового человека зараженной ВИЧ крови, спермы, выданный влагалища или материальной скота молока. Это может произойти при контакте этих биологических жидкостей с ранкой на коже, на половых органах или во рту; при совместном использовании игл, шприцей и других материалов для внутривенного введения наркотиков; при попадании ВИЧ из крови ВИЧ-инфицированной матери к ребенку во время беременности.

## ПРОФИЛАКТИКА МЕРЫ

## ИЧЕСКИЕ | тических ме имущественно учение насе возраста пол

болования являются незащищенные половые контакты. Еще одним вариантом заражения считается использование нестерильных шприцев, что в основном и распространено среди наркоманов.

ночную потливость, понос, потерю веса, частые острые респираторные инфекции, опоясывающий лишай (герпес) и др.

**КАК МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ЗАРАЖЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ?**

Вирус иммунодефицита человека передается только от человека к человеку, у человека, инфицированного ВИЧ, большее количество вируса содержится в крови, сперме, выделяемых из влагалища, грудном молоке (так называемые биологические жидкости), поэтому зарождение ВИЧ-инфекцией происходит при попадании в организмы здорового человека зараженной ВИЧ кровью, спермами, выделениями влагалища или материальными лекарствами. Это может произойти при контакте этих биологических жидкостей с ранкой на коже, на половых органах или во рту; при совместном использовании игл, шприцев и других материалов для внутривен

рус тоже прилагают, но в таком матом количестве, что опасности заражения нет.

ВИЧ-инфекцией нельзя заразиться при прокосновании рукопожатии, массаже, при совместном использовании одногоН постельного белья, питья одного стакана. Также нельзя разиться через сиденье унитаза при кашле, чихании или при укусе комаров.

**ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ**

Невозможность на сегодняшний день - создания эффективных вакцин и эффективных средств лечения ВИЧ-инфекции, трудности воздействия на первичный источник инфекции, в связи с длительным бессимптомным лечением, определяют основные мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, особенно среди лиц молодого возраста, в в профилактике наркомании, зональных половых кон-

омфорта без  
ля того что  
асно, жить  
оторую он  
ический пе-  
транский пе-  
ров, взрослые  
то прост – з-  
блодение э-  
тичной гип-  
ние наркоти-  
ните, хотя  
является н-  
евременно  
з контроли-  
Определит  
ВИЧ, нево-  
признакам  
циальный  
Спасибо  
те здоровы

бы  
в т  
соэз  
лан  
вич  
ых  
аци  
лем  
иен  
икон  
ици  
еизл  
нач  
нарж  
, и  
мож  
и. Для  
дана  
за  
р!  
т

